



Hogyan lehet megelőzni és gyógyítani a ragadós száj- és körömfájást?

Jól ismert tények a ragadós száj- és körömfájásról:

- Nagyon ellenálló éterrel, kloroformmal, Freonnal szemben .;
- Gyors inaktiváció 6-nál alacsonyabb PH alatt;
- A maximális ellenállás PH 7 - 7,5 alatt;
- Stabila hőmérséklet széles spektrumában: -70°C és $+60^{\circ}\text{C}$, néha $+80^{\circ}\text{C}$ között;
- A ragadós száj- és körömfájás leküzdésére szolgáló jelenlegi fertőtlenítő oldatok forró 3% -os NaOH-oldat és / vagy 1% -os formaldehid-oldat;
- A ragadós száj- és körömfájás vírusának bejutására szolgáló „kapuk” a nyálkahártyák és a szőrtelen bőrrészek;
- A ragadós száj- és körömfájás kórokozójának elkülönítése beteg állatok által, tej, sperma és nyál útján, még néhány nappal a betegség klinikai indikációi előtt;
- A helyreállított állatállomány továbbra is a ragadós száj- és körömfájás vírusának forrása lehet 8-24 hónapig;
- A macskák és kutyák nem mutatják a ragadós száj- és körömfájás fertőzésének tüneteit;

Az Ecowian Higén+99 formula alkalmazása a ragadós száj- és körömfájás leküzdésére.

Az Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer napi porlasztása (hideg ködgenerátorral)~ 4 L / 1000 légköbméter arányban állatok jelenlétében

Tisztított víz itatása az állatokkal Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer keverési aránya: ~ 200 ml / L, napi 10L adaggal felnőtt állatok számára és 1-1,5L / nap adaggal fiatal állatok számára;

Folyékony takarmány fertőtlenítése Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszerrel~ 500ml / L-vel, az adagolási arány 30L anolit / tonna takarmány;

A száraz takarmány fertőtlenítése (ha a gazdálkodó ezt technikai szempontból praktikusnak tartja) Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer ~ 500 ml/L, adagolási arány esetén 40-60 L Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer t (a takarmány állapotától függően) egy tonna takarmányra;

Ívóvíz fertőtlenítése Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer ~ 500 ml / L, az adagolási arány 3L anolit / 1 M3 ivóvíz;



A fejes előtt tőgyet Ecowian Higén+99 fertőtlenítse ~ 500 ml /l. Javasoljuk, hogy az Ecowian Higén+99 langyosítsa meg és sprayként használja;

A külső nemi szervek fertőtlenítése PH = 6,5-7,5, ~ 500 ml / L Ecowian Higén+99 -el mielőtt spermát vesz ki és megtermékenyítik;

Ha az Ön térségében gyakran fordul elő ragadós száj- és körömfájás, javasoljuk, hogy a járvány vége után is folytassa a fenti eljárásokat;

-A viszonylag biztonságos régiókban a ragadós száj- és körömfájás megelőzésére javasoljuk, hogy tartson be általános fertőtlenítési eljárásokat az Ecowian Magyarország Kft. által ajánlott Ecowian Higén+99 -el